


Plano de contenção de Influenza suína



Fonte: Carolyn Buxton Bridges, MD, Influenza Branch, Division of Viral and Rickettsial Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia: "Human influenza viruses and the potential for inter-species transmission" available at: <http://www.x13.info/pdf/prod13.htm>

Definição de caso suspeito de influenza suína

Pessoa que apresente febre alta, de início repentino e tosse, podendo estar acompanhada de dor de cabeça, dores musculares e nas articulações e dificuldade respiratória

E

ter apresentado estes sintomas até dez dias depois de ter saído de área afetada com a influenza suína.

As pessoas sintomáticas que tiveram contato com pacientes com as características acima também são consideradas suspeitas.

Devem ficar em observação por 10 dias.

Áreas afetadas no mundo até 29/04/09

- México;
- Estados Unidos;
- Canadá;
- Nova Zelândia;
- Espanha;
- Israel;
- Áustria;
- Alemanha.

Casos confirmados: situação em 29/04/2009

- Casos confirmados: 148 (91 nos EUA);
- Óbitos: oito (7 no México e um nos EUA).

**Brasil não tem caso
confirmado.**

Procedimentos de vigilância

- A unidade de saúde/UPA deve notificar todo caso suspeito imediatamente à GEREPI do Distrito Sanitário correspondente;
- A GEREPI deve notificar imediatamente a GEEPI;
- A GEREPI deve investigar e completar a ficha de investigação preenchida pela unidade;
- Enviar à GEEPI a ficha de notificação;
- Informar permanentemente a Gerência de Atenção à Saúde e o gerente do DS.

Indicação de uso de EPI

Equipamento	Quem deve usar?
Máscara N95	Profissional que vai realizar um procedimento próximo do paciente (distância inferior a 1 metro); Para todos que estão dentro da sala durante procedimentos geradores de aerossol
Máscara cirúrgica	Para todos os profissionais envolvidos na atenção ao paciente O paciente, sempre que estiver fora do isolamento
Luvas	Para todos os profissionais envolvidos na atenção ao paciente
Capote	Para todos os profissionais envolvidos na atenção ao paciente
Óculos e gorro	Profissional que vai realizar um procedimento próximo do paciente (distância inferior a 1 metro); Para todos que estão dentro da sala durante procedimentos geradores de aerossol


Medidas preventivas



Fonte:



Fluxo de atendimento de caso suspeito na unidade de saúde



Fluxo de atendimento de caso suspeito na unidade de saúde

Quadro de infecção respiratória aguda grave com indicação clínica de internação

SIM

- Preencher a ficha específica de investigação de caso;
- Comunicar com o SAMU (transporte específico de paciente suspeito de influenza suína);
- SAMU transportará para o hospital de referência: neste momento o HC/UFGM
- Orientar os contatos das medidas para prevenir transmissão conforme informe SMSA.

NÃO

- Preencher a ficha específica de investigação de caso;
- Orientar repouso no domicílio e uso de sintomáticos (exceto AAS);
- Orientar o paciente e seus contatos medidas para prevenir transmissão conforme informe SMSA;
- O paciente não deve usar transporte público coletivo para retornar ao domicílio. Se necessário, chamar o SAMU.
- Aguardar a visita domiciliar do PAD que coletará secreções respiratórias para exame de laboratório.

Fluxo de atendimento de caso suspeito na UPA

Quadro infecção respiratória aguda grave com indicação clínica de internação

SIM

- Preencher a ficha específica de investigação de caso;
- Comunicar com o SAMU (transporte específico de paciente suspeito de influenza suína);
- SAMU transportará para o hospital de referência: neste momento o HC/UFMG
- Orientar os contatos das medidas para prevenir transmissão conforme informe SMSA.

NÃO

- Preencher a ficha específica de investigação de caso;
- Orientar repouso no domicílio e uso de sintomáticos (exceto AAS);
- A coleta de secreções respiratórias para exame de laboratório será providenciada pela GEEPI neste momento;
- Orientar o paciente e seus contatos medidas para prevenir transmissão conforme informe SMSA.

Fluxo de atendimento de caso suspeito na comunidade

Paciente vindo do exterior nos últimos 10 dias, inicialmente sem sintomas e depois com sintomas

- Permanecer no domicílio;
- Comunicar com o call center e aguardar o contato telefônico inicial do PAD influenza.

**Call center:
0800 2832255**